

Naam

Geboortedatum

Instellingscode

Datum

Arts

- Eerste voorschrift
- Vervolg voorschrift
- Wijziging
- Laatste voorschrift
- Stop

Dit is blad van

Revisie

 Weken
 Maanden

- Doelsymptomen**
- Hyperactiviteit*
 - Impulsiviteit*
 - Concentratie*
 - Oppositieel*
 - Agressie*
 - Angst*
 - Depressie*
 - Stemmingswisselingen*
 - Tics*
 - Dwang*
 - Wanen/Hallucinaties*
 -

Diagnostiek

Hoofddiagnose (DSM-IV)

CGI - Ernst

zeer licht .. licht .. matig .. ernstig .. zeer ernstig

Neveniagnoses (DSM-IV as I & as II)

CGI - Verbetering

sterk verslechterd..verslechterd..onveranderd..verbeterd..sterk verbeterd

- Bijwerkingen**
- Geen**
 - Angst*
 - Stemmingswisselingen*
 - Prikkelbaar*
 - Buikpijn*
 - Misselijkheid*
 - Eetlustverlies*
 - Gewichtstoename*
 - Duizeligheid*
 - Sufheid*
 - Slaapproblemen*
 - Vermoeidheid*
 - Hoofdpijn*
 - Tic's*
 - Seksuele klachten*
 - Extrapyramidale Bijw*
 -

Rx

<i>Naam Geneesmiddel</i>	<i>Toedieningsvorm en sterkte</i>	<i>Doseringsfrequentie</i>	<i>D.t.d.</i>
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------

Aantekeningen

Somatische Controles

Toelichting gebruik Medicatieformulier

Dit medicatieformulier is ontworpen voor het starten én het vervolgen van een medicamenteuze behandeling. Bij ieder consult wordt (minimaal) één formulier ingevuld, en tevens voor ieder extra medicament een nieuw blad. Vakjes worden ingevuld, rondjes worden aangekruist.

De gegevens bovenaan en linksboven dienen ter identificatie van patiënt, consult en arts en altijd ingevuld.

‘Eerste voorschrift’ wordt aangekruist bij het starten met een nieuw middel. Het blok ‘Diagnostiek’ (de indicatie voor het starten met een middel) alleen bij een eerste voorschrift invullen.

CGI staat voor Clinical Global Impression, om het oordeel van de clinicus over de ernst en verbetering eenvoudig op een 5-puntsschaal te scoren.

‘Vervolg voorschrift’ en ‘Wijziging’ worden aangekruist wanneer met hetzelfde middel wordt doorgedaan. Met ‘Laatste voorschrift’ wordt aangegeven dat het middel wordt afgebouwd en met ‘Stop’ dat inmiddels is, of meteen wordt gestopt.

De vakken ‘Doelsymptomen’ en ‘Bijwerkingen’ en ‘CGI-verbetering’ worden bij aanvang en bij iedere controle opnieuw ingevuld. De keuze om doelsymptomen te vervolgen sluit aan bij de klinische praktijk. Het kan echter zijn dat in de loop van de behandeling hierin verschuivingen optreden. Ook dit kan worden aangegeven.

In het vak medicatie kan het middel, de afleveringsvorm- en sterkte en de hoeveelheid in te nemen medicatie worden aangegeven zoals op een recept. Bij ‘D.t.d.’ kan worden aangegeven voor hoeveel eenheden receptuur is meegegeven. Als de receptuur door een andere arts wordt gedaan kan dat hier worden vermeld, bijvoorbeeld door hier ‘huisarts’ in te vullen.

Tot slot kan links worden ingevuld dat er een tweede blad bestaat voor een tweede middel, en wanneer een revisie is afgesproken. Eventuele aantekeningen en somatische controles kunnen onderaan als vrije tekst genoteerd worden.